

Tabel voor twintig algemene boomschorsbegroeiende korstmossen

Ontleend aan: *Basisnatuurboek, NJN, 1995*

Met regen verkleuren de korstmossen naar groen, dan werkt deze tabel niet.

- | | | | |
|----|---|-----|--|
| 1 | a. Korstmos bestaat uit takjes en groeit afhankelijk (struikvormig) | →3 | |
| | b. Korstmos groeit duidelijk tegen schors aangedrukt | →2 | |
| 2 | a. Korstmos is duidelijk gelobd, vooral aan randen (bladvormig) | →5 | |
| | b. Korstmos heeft geen bladachtige structuren (korstvormig) | →15 | |
| 3 | a. Takjes op doorsnee rond. Baardmos, <i>Usnea subfloridana</i> . | | |
| | b. Takjes op doorsnee duidelijk plat | →4 | |
| 4 | a. Onderkant van takjes duidelijk wit, takjes vrij breed en stomp. Eikemos , <i>Evernia prunastri</i> | | |
| | b. Boven- en onderkant hebben zelfde grijze kleur, takjes slank en spits. Melig takmos , <i>Ramalina farinacea</i> | | |
| 5 | a. Korstmos minstens ten dele geel of oranje (dooiermossen). | →6 | |
| | b. Korstmos grijs, bruin of groen. | →8 | |
| 6 | a. Korstmos bestaat uit rozetjes van gekroesde blaadjes, geen bekervormige structuren. Kroezig dooiermos , <i>Xanthoria candelaria</i> | | |
| | b. Korstmos anders, meestal met duidelijke oranjegele bekertjes | →7 | |
| 7 | a. Opvallend geel plakkaat meestal met oranjegele bekertjes. Groot dooiermos , <i>Xanthoria parietina</i> | | |
| | b. Vooral de feloranje bekertjes vallen op, de omringende lobben zijn klein en grijsig. Klein dooiermos , <i>Xanthoria polycarpa</i> | | |
| 8 | a. Lobjes ongeveer een of twee millimeter breed. | →9 | |
| | b. Lobben opvallend breed, vier millimeter of meer (schildmossen). | →12 | |
| 9 | a. Lobben zien er duidelijk opgeblazen en hol uit. Gewoon schorsmors , <i>Hypogymna physodes</i> | | |
| | b. Lobben anders (vingermossen). | →10 | |
| 10 | a. Korstmos is in het midden duidelijk donkerder ("vuil") dan aan de randen. Rond schaduwmos , <i>Phaeophyscia orbicularis</i> | | |
| | b. Korstmos min of meer egaal grijs. | →11 | |
| 11 | a. Veel van de lobjes hebben aan het uiteinde een duidelijk kapje. Grof kroesmos , <i>Physcia adscendens</i> | | |
| | b. Lobjes aan de rand meestal een beetje omhoog gebogen. Fijn kroesmos , <i>Physcia tenella</i> | | |
| 12 | a. Korstmos grijs gekleurd. | →13 | |
| | b. Korstmos anders gekleurd. | →14 | |
| 13 | a. Bovenkant vertoont vaak Kleine witte barstjes, onderkant is donkerbruin. Gewoon schildmos , <i>Parmelia sulcata</i> | | |
| | b. Bovenkant vertoont duidelijk witte puntjes, onderkant lichtbruin. Gestippeld schildmos , <i>Parmelia subrudecta</i> | | |
| 14 | a. Korstmos bruin, valt door Kleur nauwelijks op. Verstoppschildmos , <i>Parmelia subaurifera</i> | | |
| | b. Korstmos donkergroen met zeer brede lobben. Olijfschildmos , <i>Parmelia acetabulum</i> | | |
| 15 | a. Korstmos duidelijk geel. Grove geelkorst , <i>Candelariella vitellina</i> | | |
| | b. Korstmos anders gekleurd. | →16 | |
| 16 | a. Korstmos grijs met vele zwarte spikkeltjes. Vliegestrontjesmos , <i>Buellia punctata</i> | | |
| | b. Dergelijke spikkels ontbreken. | →17 | |
| 17 | a. Korstmos bestaat enkel uit korst. | →18 | |
| | b. Korstmos vertoont duidelijke piepkleine bruine schoteltes meteen witte rand. | →19 | |
| 18 | a. Korst korrelig, blauwig, vaak in schorsspleten. Gewone poederkorst , <i>Lepraria incana</i> | | |
| | b. Korst glad, groenig. Bleekgroene schotelkorst , <i>Lecanora expallans</i> | | |
| 19 | a. Korstmos bestaat enkel uit "dubbeltjes". Verborgen schotelkorst , <i>Leconora dispersa</i> | | |
| | b. Tussen de "dubbeltjes" is ook duidelijk een grijzige korst te zien. Witte schotelkorst , <i>Leconora chlorotera</i> | | |